

بررسی تغییرات سریال پیک فلومتری در شاغلین سالن تولید رنگ کارخانه رنگسازی

سیامک پورعبدیان^۱، احسان ا. حبیبی^۲، پرستو کلشیری^۳، اکبر حسن زاده^۴، ابوالحسن شاهری^۵

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به شیوع بالای بیماریهای تنفسی در صنایع شیمیایی و رنگسازی به علت عوامل متعدد بیماریزا در این مشاغل بهبود روش‌های پایش شاغلین برای ارزیابی وضعیت تنفسی از ابزارهای مهم در پیشگیری از بروز این بیماریها می‌باشد. ارزیابی تنفسی صور بالینی و آزمایشگاهی متعددی داشته است از بین این روش‌ها آزمایش ارزیابی پیک فلومتری جایگاه جدیدی دارد.

روش بررسی: در این مطالعه cross Sectional ۳۰ نفر از افراد شاغل در خطوط تولید رنگ کارخانه به مدت دو هفته متواالی تحت آزمایش پیک فلومتری قرار گرفته‌اند. آزمایش در ساعت‌های ابتداء انتها شیفت و برای ۱۴ روز متواالی انجام شده است. مقادیر خام و میانگین مقادیر بدست آمده در هر روز با مقادیر روزهای دیگر هفتة مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته‌اند استفاده از مقادیر در هفته دوم برای بالا بردن دقت آزمون و حذف عوامل مخدوش کننده بکار رفت که همبستگی بالای نتایج مربوط به دو هفته متواالی دقت ارزیابی را مورد تأیید قرار داد.

یافته‌ها: میانگین پیک فلومتر کارگران در آخرین روز کاری هفته به نسبت روز اول تفات معنی دار نشان داد ($P < 0.01$) این تفاوت در نتایج حاصل از هفته دوم نیز تکرار شد ($P < 0.01$) ($P = 0.08$). الگوی روزانه تغییرات دراین مقدار نیز مؤید کاوش این میزان در انتها شیفت به نسبت ابتدای شیفت بوده است. از شاغلین مورد بررسی ۶۷٪ (۱۷ نفر) علیرغم نشان دادن تغییرات در سریال پیک فلومتری در آزمون اسپیرومتری FVC نکته پاتولوژیک نشان نداده بودند. نتایج حاکی از بیشترین تغییرات در پیک فلومتری در روز اول بعد از استراحت به نسبت روز آخر هفته بوده‌اند. ($16/5 \pm 35$ در مقابل $11/8 \pm 6/3$)

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به نظر می‌رسد تست سریال پیک فلومتری برای پایش و پیگیری تأثیر پذیری شاغلین از عوامل بیماریزا تنفسی موجود در محیط کار آزمایش حساستری به نسبت اسپیرومتری تست FVC باشد.

کلیدواژه‌ها: پیک فلومتری، رنگ، کارخانه

تنفسی مرتبط با کار در اکثر کشورهای صنعتی است. برآورده شده است بین ۱۰ تا ۴۰ درصد موارد آسم، مرتبط با شغل باشد. تاکنون تقریباً ۲۵۰ مورد از مواد آسموژن شناخته شده است. این رقم در آینده افزایش خواهد یافت زیرا مواد جدیدی به طور پیوسته در محیط‌های کاری وارد می‌شوند. در صنعت رنگسازی

مقدمه

کارگران بعضی مشاغل، در معرض عوامل شغلی آسم بوده و بدین طریق مبتلا به بیماری آسم شغلی می‌شوند. آسم شغلی، معمول‌ترین علت بیماری

۱-نویسنده باسخگو، عضو هیئت علمی گروه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(fdgir@yahoo.com)

۲-۳-عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۴-کارشناس ارشد بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آسموژن، الگوی تغییرات پیک فلو را در کارگران مذکور مشاهده کنیم. به عبارت دیگر رسیدن به این هدف که بررسی الگوی تغییرات سریال پیک فلومتری، روشی برای نشان دادن رابطه بین عامل شغلی آسموژن و آسم شغلی است.

نیاز به انجام آزمایشات پاراکلینیکی کاربردی در یک دوره زمانی بویژه تست سریال پیک فلومتری، برای پایش کارگران در تماس با مواد آسموژن و تشخیص آسم شغلی در صنایع کشور، از ضرورت‌های اجرای این طرح می‌باشد. همچنین نتایج این طرح می‌تواند برای تحقیقات بعدی مرتبط استفاده گردد.

روش بروزی

(Cross – Sectional) این مطالعه از نوع مقطعی بوده و جمعیت مورد مطالعه کل کارگران سالن تولید رنگ کارخانه خود رنگ اصفهان می‌باشد. کل جامعه مورد بررسی ۳۰ نفر بوده و چون امکان مطالعه روی تمام آنها وجود داشت بررسی بصورت سرشماری انجام شده است. یعنی تعداد نمونه با جامعه برابر است.

معیار انتخاب افراد افراد جهت مطالعه، شاغل بودن در سالن تولید رنگ کارخانه خود رنگ اصفهان و معیار خروج افراد از مطالعه، ابتلاء به عفونت‌های حاد تنفسی و همچنین غیبت از کار در طی دوره بررسی بوده است (بیماری ریوی مانند آسم و سیگاری بودن افراد جزء معیار خروج از مطالعه نیست زیرا هدف از انجام این مطالعه بررسی تغییرات سریال پیک فلومتری است و این تغییرات در حالت آسم و در افراد سیگاری که در معرض عوامل آسموژن شغلی قرار دارند نیز، می‌تواند اتفاق بیفتد.).

برای انجام این تحقیق، ابتدا پرسشنامه مشخصات فردی و شکایات تنفسی برای تمام افراد مورد بررسی که ۳۰ کارگر سالن تولید رنگ می‌باشند، تکمیل گردید. سپس روش صحیح انجام تست پیک فلومتری به وسیله دستگاه پیک فلومتر، به کارگران مورد نظر آموژش داده شد (دستگاه پیک فلومتر مدل Asma PLAN ساخت شرکت وايتالوگراف انگلستان مورد استفاده قرار گرفته است).

برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز این بررسی که پیک فلو اندازه‌گیری شده برای کلیه کارگران سالن تولید رنگ می‌باشد، در مدت دو هفته کاری متوالی که

دو ترکیب شیمیایی تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) و رزین اپوکسی، جزء مواد آسموژن بوده و از نظر ایجاد آسم شغلی دارای اهمیت هستند.

آسم شغلی تنگی متغير مجاری هوایی تنفسی است که در اثر تنفس مواد آسموژن به شکل گرد و غبار هوای بد، گاز، بخار یا فیوم، در محیط کار ایجاد می‌شود. آسم شغلی بیماری است که معمولاً با محدودیت متغير جریان هوای در مجاری هوایی تنفسی مشخص می‌گردد. خس خس سینه، فشردگی قفسه سینه، کوتاهی نفس و سرفه از علائم آسم شغلی است.

به علت متغير بودن وضعیت تنفسی در بیماران آسم، ارزیابی‌های متعدد عملکرد ریوی کارگران مشکوک در یک دوره زمانی (مثلاً انجام تست سریال پیک فلومتری) دارای اهمیت می‌باشد. متغير بودن وضعیت تنفسی در بیماری آسم باعث می‌شود تا الزاماً زمان انجام ارزیابی تنفسی، مطابق با زمان افت وضعیت تنفسی نباشد.

تست سریال پیک فلومتری، آزمونی است که در آن حداکثر جریان بازدمی (Peak Expiratory Flow) یا پیک فلو فرد مورد آزمایش به صورت متوالی (سریال) در فواصل زمانی مشخص اندازه‌گیری شده و بدین ترتیب مقادیر متوالی پیک فلو به دست می‌آید. همچنین تست سریال پیک فلومتری یک ابزار معتبر برای تأیید ارتباط بین تماس شغلی و آسم است.

حداکثر جریان بازدمی (PEF)، حداکثر جریان هوایی است که شخص بعد از یک دم عمیق و در طی یک بازدم سریع و با حداکثر نیرو، می‌تواند ایجاد کند. پیک فلو را می‌توان بوسیله دستگاهی به نام پیک فلومتر و بر حسب لیتر در دقیقه اندازه‌گیری کرد. پیک فلومتر در واقع یک کنترول ساده و قابل حمل می‌باشد. اهداف جزئی این تحقیق عبارت است از: تعیین میانگین پیک فلو کارگران در روز اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم هفته (روزهای کاری هفته)، تعیین نسبت میانگین پیک فلو روز ششم به روز اول هفته و نیز تعیین ارتباط بین نسبت میانگین پیک فلو روز ششم به روز اول هفته و متغيرهای سابقه کار شاغلین، سن شاغلین و سیگاری بودن شاغلین.

هدف از انجام این تحقیق این بوده که، با قبول این فرض که ماده آسموژن در صنعت رنگ سازی داریم، آیا می‌توانیم با انجام تست سریال پیک فلومتری برای کارگران سالن تولید رنگ در معرض عوامل شغلی

بالاخره درصد تغییرات پیک فلو روزانه از از ۱۰٪ تا کمتر از ۲۰٪ (محدوده مشکوک)، در هفته اول در ۱۷ نفر و در هفته دوم در ۱۵ نفر ثبت شده است.

۴ - نسبت پیک فلو میانگین روز ششم به روز اول هفته برای ۳۰ کارگر مورد بررسی در هفته اول دارای بیشترین مقدار ۹۶٪، کمترین مقدار ۸۲٪، و نیز میانگین و انحراف معیار 0.04 ± 0.08 بوده است و در هفته دوم دارای بیشترین مقدار ۹۵٪، کمترین مقدار ۸۲٪ و همچنین میانگین و انحراف معیار 0.03 ± 0.06 بوده است. نتیجه آزمون آماری همبستگی پیرسون در مورد رابطه بین نسبت مذکور، در هفته اول و هفته دوم نشان داد که این رابطه یک رابطه قوی و مستقیم است ($P-value < 0.001$).

۵ - بررسی نتایج پیک فلومتری نشان می دهد کاهش پیک فلو بعدازظهر در مقایسه با صبح، در اکثریت کارگران مورد مطالعه در اولین روز کاری هفته، بیشتر از روزهای دیگر هفته و به خصوص روز آخر کاری هفتة است. میانگین مقدار کاهش پیک فلو بعدازظهر نسبت به صبح در کارگران مورد بررسی، در روز اول هفته اول 48 ± 12 لیتر در دقیقه، در روز آخر کاری هفته اول مقدار 26 ± 16 لیتر در دقیقه، در روز اول هفته دوم 56 ± 16 لیتر در دقیقه و در روز آخر کاری هفته دوم 88 ± 11 لیتر در دقیقه به دست آمده است.

۶ - نتیجه آزمون آماری همبستگی پیرسون در مورد وجود رابطه بین نسبت پیک فلو میانگین روز پنجشنبه به شنبه و سابقه کارشاغلین نشان داد، نسبت فوق در هر دو هفته مورد ارزیابی، با سابقه کارشاغلین رابطه معکوس داشت ($P-value < 0.001$ و $r = -0.617$) و ($P-value < 0.001$ و $r = -0.572$) برای هفته اول و برای هفته دوم.

۷ - نتیجه آزمون آماری همبستگی پیرسون در مورد وجود رابطه بین نسبت پیک فلو میانگین روز پنجشنبه به شنبه و سن شاغلین مورد مطالعه نشان داد، نسبت مذکور در هر دو هفته مورد ارزیابی، با سن شاغلین رابطه معکوس دارد:

($P-value < 0.001$ و $r = -0.505$) برای هفته اول و ($P-value < 0.001$ و $r = -0.502$) برای هفته دوم).

۸ - براساس نتایج پیک فلومتری متوسط نسبت پیک فلو میانگین روز پنجشنبه به شنبه در کارگران مورد

هر هفته شامل ۶ روز کاری (شنبه تا پنجشنبه) و هر روز شامل یک شیفت کاری ۸ ساعته (صبح تا ۷/۵ بعدازظهر) بوده، تست پیک فلومتری انجام شده است. در هر روز دو بار، نوبت اول در ابتدای شیفت کاری (صبح) و نوبت دوم در پایان شیفت کاری (بعداز ظهر) برای تمام ۳۰ کارگر مورد نظر تست پیک فلومتری انجام گردیده و این عمل برای تمام روزهای کاری دو هفته متوالی (عروسز در هفته و جمعاً ۱۲ روز) تکرار شد. نتیجه هر نوبت آزمایش که بیشترین مقدار قرائت شده از میان سه اندازه گیری انجام شده در هر نوبت می باشد، ثبت گردید. لذا در هر روز دو مقدار پیک فلو شامل پیک فلو ابتدا و پایان شیفت برای هر کارگر ثبت شد. نتایج اندازه گیری ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمونهای آماری همبستگی پیرسون و T-Test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

پافته ها

۱ - متوسط مقدار پیک فلو میانگین روزانه ۳۰ کارگر، در هفته اول کاری مورد مطالعه از روز شنبه تا پنجشنبه به ترتیب 433 ± 40 ، 397 ± 39 ، 402 ± 41 ، 390 ± 39 و 390 ± 39 لیتر در دقیقه و در هفته دوم به ترتیب 406 ± 40 ، 409 ± 41 ، 440 ± 40 ، 409 ± 41 و 396 ± 40 لیتر در دقیقه بوده است.

آزمون T-test تفاوت میانگین پیک فلو کار ۴۳۳ لیتر در دقیقه) و روز آخر هفته اول ($t=1/2$ و $P=0.001$) لیتر در دقیقه) را معنی دار نشان داده ($P-value < 0.001$)، همچنین تفاوت میانگین پیک فلو کارگران در روز اول هفته دوم ($t=8/8$ و $P=0.001$) لیتر در دقیقه) و روز آخر هفته دوم ($t=6/8$ و $P=0.001$) لیتر در دقیقه) با آزمون T-Test معنی دار بوده است ($t=21/2$ و $P-value < 0.001$).

۲ - نتایج اندازه گیری پیک فلو کارگران مورد بررسی در دو هفته کاری متوالی نشان می دهد مقدار پیک فلو بعد از ظهر کارگران، کمتر از پیک فلو صبح آنها در تمام روزهای کاری هفته می باشد.

۳ - درصد تغییرات پیک فلو روزانه در ۳۰ کارگر مورد بررسی، در هفته اول انجام پیک فلومتری در ۱۲ کارگر و در هفته دوم در ۱۵ کارگر، فقط کمتر از ۱۰٪ (محدوده نرمال) بود. همچنین درصد تغییرات پیک فلو روزانه ۲۰٪ و بیشتر از ۲۰٪ (معیار آسم شغلی) در طی دو هفته مطالعه، فقط در یک کارگر مشاهده شد و

صبح و بعداز ظهر و میانگین روزانه کارگران، وضعیت تنفسی کارگران در اول هفته بهتر و در آخر هفته بدتر است و در طول هفته کاری مقادیر پیک فلو این افراد با الگویی تقریباً نزولی همراه با افزایش های موردی در روزهای دیگر هفتگه کاهش می یابد و می توان گفت تست سریال پیک فلومتری روشنی است برای نشان دادن شغلی بودن کاهش پیک فلو.

۳- در اکثریت کارگران، بیشترین و کمترین پیک فلو میانگین روزانه در طول هفته کاری، به ترتیب مربوط به روز شنبه و پنجشنبه بوده است. ثبت حداقل پیک فلو میانگین روزانه برای تمام کارگران، طی هفته کاری در روز شنبه (روز اول هفته کاری) را می توان به تعطیلی روز قبل و بهبودی وضعیت تنفسی کارگر در این روز مرتبط دانست. همچنین ثبت بیشتر از نیمی از موارد حداقل پیک فلو روزانه در روز پنجشنبه (روز آخر کاری هفته) را می توان به تأثیر تماسهای شغلی کارگران با عوامل زیان آور آسموژن در طول هفته کاری نسبت داد.

۴- وجود رابطه قوی و مستقیم بین نسبت های پیک فلو میانگین روز آخر به روز اول هفته، در هفته اول و هفته دوم، بیانگر آن است که مقدار نسبت مذکور، در هفته دوم تقریباً مانند هفتگه اول بوده و روند اندازه گیری پیک فلو طی دو هفته توالی تأیید می شود و می توان نتیجه گرفت حداقل دو هفته توالی برای انجام تست سریال پیک فلومتری کافی می باشد.

۵- براساس مقادیر P-value و ضریب همبستگی (r) به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون درخصوص تعیین رابطه بین نسبت پیک فلو میانگین روز آخر به روز اول هفته کاری با متغیرهای سن و سابقه کار شاغلین، سابقه کار در مقایسه با سن، رابطه معکوس قوی تری با نسبت مذکور دارد. این مسأله نشان دهنده تأثیر بیشتر سابقه کار در مقایسه با سن، بر روی نسبت پیک فلو میانگین روز آخر به روز اول هفته است.

۶- میزان پیک فلو افراد سیگاری نسبت به افراد غیر سیگاری کمتر است. همچنین از وجود تفاوت معنی دار بین نسبت پیک فلو میانگین روز آخر به روز اول هفته کاری در کارگران سیگاری و غیر سیگاری می توان نتیجه گرفت بین نسبت فوق و سیگاری بودن افراد رابطه وجود دارد.

بررسی سیگاری، کمتر از غیر سیگاری ها می باشد. آزمون T-Test اختلاف بین نسبت پیک فلو میانگین روز آخر به روز اول هفته کاری در افراد سیگاری و غیر سیگاری را معنی دار نشان داد:

$t = 2/24$ و $P-value = 0/013$ برای هفته اول و همچنین $t = 0/81$ و $P-value = 0/04$ برای هفته دوم. از وجود تفاوت معنی دار بین نسبت فوق در افراد سیگاری و غیر سیگاری مورد بررسی می توان نتیجه گرفت بین نسبت فوق و سیگاری بودن افراد رابطه وجود دارد.

۹- متوسط نسبت پیک فلو میانگین روز آخر به روز اول کاری هفته در شاغلین دارای سرفه کمتر از مقدار مذکور در شاغلین بدون سرفه است. آزمون T-test تفاوت نسبت فوق را در شاغلین دارای سرفه و شاغلین بدون سرفه در هر دو هفتگه مورد مطالعه معنی دار ندانست ($t = 1/69$ و $P-value = 0/053$) و همچنین $t = 1/23$ و $P-value = 0/11$ برای هفته دوم).

۱۰- متوسط نسبت پیک فلو میانگین روز آخر به روز اول کاری هفته در شاغلین دارای خس سینه کمتر از مقدار مذکور در شاغلین بدون خس خس سینه است. آزمون T-test تفاوت نسبت فوق را در شاغلین دارای خس سینه و شاغلین بدون خس سینه مورد مطالعه معنی دار ندانست ($t = 1/75$ و $P-value = 0/045$) و همچنین $t = 1/68$ و $P-value = 0/05$ برای هفته اول و همچنین $t = 1/22$ و $P-value = 0/005$ برای هفته دوم).

۱۱- متوسط نسبت پیک فلو میانگین روز آخر به روز اول کاری هفته در شاغلین دارای تنگی نفس کمتر از مقدار مذکور در شاغلین بدون تنگی نفس است. آزمون T-test تفاوت نسبت فوق را در شاغلین دارای تنگی نفس و شاغلین بدون تنگی نفس در هر دو هفتگه مورد مطالعه معنی دار ندانست ($t = 4/17$ و $P-value = 0/003$) و همچنین $t = 2/92$ و $P-value = 0/001$ برای هفته دوم).

نتیجه گیری

- از کمتر بودن پیک فلو بعداز ظهر در مقایسه با پیک فلو صبح در کارگران میتوان دریافت، تماس شغلی با عوامل آسموژن محیط کار در طی شیفت کاری بر روی پیک فلو کارگران در معرض تأثیر می گذارد.
- براساس نمودار دو هفتگه ای مقادیر پیک فلو

منابع

- ۱- هومن مروی، احمد. عظیمی ناتوایی، علیرضا. شیمی تجربی رنگ. چاپ دوم. تهران. انتشارات امیرکبیر، ۲۶: ۱۲۷۵-۱۲۴۵ و ۲۴۶-۲۴۵.
۲. Padoan M, Pozzato V, Simoni M, et al.. Long-term follow-up pf toluene diisocyanate-induced asthma. Eur Respir J 2003; 21: 637-640.
3. Banks DE. Respiratory effects of Isocy- anates. in: Rom WN, ed. Environmental and occupational medicine. 3 rd ed. Philadelphia. Lippincott- Raven publishers. 1998; 537-552.
4. Newman Taylor Ag. Occupational asthma. In: Baxter pj, Adams PH, Tar-ching AW, cockcroft A, Harrington JM, eds. Hunters diseases of occupational , pth ed. Londen, Arnold publisher, 2000: 633. 647.
5. Ricciardi L, Fedele R, Saitta S, et al. Occupational asthma due to exposure to iroko wood dust. Ann Allergy Asthma Immunol. 2003; 91: 393-397.
6. Sherson D, Andersen B, Hansen IB, Kjoller H. Occupational asthma due to freeze- dried raspberry. Ann Allergy Asthma Immunol. 2003; 90: 660-663.
7. Bernstein IL, Chan Yeung M, Malo J-L. Definition and classification of asthma in: Bernstein IL, chan - Yeung M., malo J-L, Bernstein DI, eds. Asthma in the work place 2nd, ed. New Yorkm Dekker.
8. Vandenplas O, Malo JL. Definition and types of work -related asthma: a nosological approach. Eur Respir J 2003, 21: 706-712.
9. Christiani DC, Wegman DH, Respiratory Disorders. In: Levy BS, Wegman DH, eds. Occupational health: Recognizing and preventing work - Related disorders and Injury, 4th ed. Philadelphia , lippincott williams & wilkins, 2000; 488-490.
10. Anees W. Use of pulmonary function tests in the diagnosis of occupational asrhma a. Ann Allergy Asthma Immunol. 2003; 90: (suppl)
11. Burge S, Moscato G. Phusiological Assessment serial measures of lung function in: Bernstein IL, chanOyeung M, malo J-L, Bernstein DI, eds. Asthma in the work place 2nd, ed. New Yorkm Dekker, 1999: 193-207.
12. Demeter SL, Cordasco EM. Occupational Asthma. in: Zens c, ed. Occupational medical , 3th ed. Mosby, 1994: 213-226.
13. Mendoza GR, Fied J Evaluation and testing for Asthme. Journal 2003; 40(suppl): 1-17.
14. Ghio AJ, Castellan RM, Kinsley KB, Hankin - son JL. Changes in forced expiratory volume in one second peak expiratory flow Rate across a work shift amang unexposed blue collar workers. Am Rev Respir Dis 1991; 143: 1231-1234.
15. Bernstein DI. Clinical Assessment and measurment of occupational asthma , Bernstein IL, can- yeung M, Malo J-L, Bernstein DI, eds. Asthma in the work place 2nd, ed. New Yorkm Dekker, 1999: 193-207.
16. Brooks SM. Occupational and Environmental Asthma. in: Ron wn, ed. Environmental and occupational medicine , 3 rd ed. Philadelphia , lippincott- Raven publishers, 1998; 481-510.
17. Mail J-L, Trudeau c, ghezzo H, et al. Do subjects investigated for occupational Assthma through serial peak expiratory flow measurements falsify their results? JAllergy clin Immunol 1995; 96:601-607.
18. Cote J, Kennedy S, Chan-Yaung M. Sensitivity and specificity of pc20 and peak expiratory flow rate in cedar asthma. J Allergy clin Immanol 1990; 85: 592-598.
19. Moscato G, et al. statement on self- monitoring of peak expiratory flows in the onvestigation of occupational asthma. JAllergy clin Immanol 1995; 96: 295-301.
20. Gannon PF, Burge PS. Serial peak expiratory flow measurement in the occupational asthme. Eur Respir J 1997; 24(suppl): 57s - 65s (Abstract)
21. Jindal SK, AggarwallAN, Ghupta D. Diurnal variability of peak expiratory flow. Journal of Asthma2002; 363-373.
22. Bellia V, et al. Questionnaires, spirometry and PEF monitoring in epidemiological studies on elderly repiratory patients. Eur Resir J 2003; 21(suppl): 21s-27s.
23. Bright P, Burge PS. The diagnosis of occupational asthma serial measurements of lung function at and away from work. Thorax 1996; 51:857-863.
24. Henneberger PK, et al. The use of portable peak flow meters in the surveillance of occupational asthma. Chest 1991;100: 1515-1521.
25. Kongerud J et al. Serial measurements of peak expiratory flow and responsiveness to methacholine in the diagnosis of aluminium potroom asthma. thorax 1992; 47: 292-297.