



Analyzing occupational lung disease among turquoise miners

Mohammad Reza Majdi¹
Ehsan Rafeemanesh²
S. Morteza Ehteshamfar³
Mohammad Javad Fahool⁴
Saeid Masoodi⁵

Received: May 14, 2009

Revised: May 25, 2009
July 4, 2009

Accepted : August 22, 2009

Abstract

Background and Aims: Low dose and long term exposure to inorganic, organic, irritant and allergic substances in workplaces can slowly and gradually cause chronic diseases such as chronic bronchitis ,asthma and pneumoconiosis. The purpose of this study is the exact determination of lung diseases prevalence in Turquoise Miners and determination of associated factors in these diseases.

Methods: In this cross-sectional survey, 117 of retired and present workers of Nishabour Turquoise Mine were studied about lung diseases. Data was collected by using respiratory questionnaire, interview, lung examination, spirometry, chest X-Ray and Manto test.

Results: Mean age of workers was 42.9, Experience mean was 11.5 years. 7 workers suffered from simple silicosis and one worker suffered from PMF. All of patients had been retired. Abnormal spirometry was presented in 30/3% that 25% of them were obstructive, 4% of were restrictive and 13% of them were mixed.

Conclusion: The results of this survey show that exposure to silica dust besides of silicosis, causes obstructive lung diseases. Because of cureless complications and permanent disability of this disease, preventive measures in mines especially primary preventive measures are effective methods for prevention that must be considered by employee, employers and occupational health specialists.

Keywords: Turquoise Mine, lung diseases, pneumoconiosis, silica

-
1. PhD, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
 2. Corresponding author, Occupational Health Specialist, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. rafeemanesh@yahoo.com
 3. MPH, PhD, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
 4. MSc of Occupational Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
 5. BS of Occupational Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.



بررسی بیماریهای ریوی شغلی در کارگران معدن فیروزه

محمد رضامجدی^۱، احسان رفیعی منش^۲، سید مرتضی احتشام فر^۳، محمد جواد فحول^۴، سعید مسعودی^۵

تاریخ پذیرش: ۱۳۸۸/۵/۲۸

تاریخ ویرایش: ۱۳۸۸/۳/۴

تاریخ دریافت: ۱۳۸۸/۱/۲۵

۱۳۸۸/۴/۱۳

چکیده

زمینه و هدف: مواجهات کم و طولانی مدت با مواد معدنی، آلی، محرک یا آلرژنها در محیط کار میتواند بصورت آرام و تدریجی کارگران را دچار بیماریهای مزمنی همچون برونشیت مزمن، آسم، پنوموکونیوزیس و غیره نماید. هدف از انجام این مطالعه تعیین دقیق شیوه بیماریهای ریوی در بین معدنکاران فیروزه و تعیین برخی عوامل همراهی کننده می باشد.

روش بررسی: در این مطالعه مقطعی، ۱۱۷ نفر از کارگران فعلی و بازنیسته معدن فیروزه نیشابور از نظر بیماریهای ریوی مورد بررسی قرار گرفتند. داده های این پژوهش از طریق مصاحبه، تکمیل پرسشنامه تفسی، معاینه ریه، اسپیرومتری، رادیوگرافی قفسه صدری و تست مانتو استخراج گردید. **یافته ها:** میانگین سنی شاغلین مورد بررسی ۴۲/۹ و میانگین سنوات کار آنان در معدن ۱۱/۵ سال بود. ۷ نفر از شاغلین مبتلا به بیماری سیلیکوزیس ساده و ۱ مورد مبتلا به فیبروز پیشرونده ریه، همگی از بازنیستگان معدن فیروزه بودند. از مجموع ۳۰/۳ درصد شاغلین دارای تست اسپیرومتری غیرنرمال، ۲۵ درصد دارای الگوی انسدادی، ۴ درصد دارای الگوی تحبدی و ۱/۳ درصد دارای الگوی مخلوط بودند.

نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان می دهد که مواجهه کارگران با گردوغبار سیلیس علاوه بر ابتلاء به بیماری سیلیکوزیس، منجر به افزایش دیگر مشکلات تنفسی بویژه بیماریهای انسدادی ریوی، میگردد. بعلت عوارض غیر قابل درمان و ناتوانی دائمی ناشی از ابتلاء به این بیماری انجام اقدامات پیشگیرانه در معادن بخصوص اقدامات سطح اول پیشگیری موثرترین روش های پیشگیری می باشند که باید مورد توجه کارفرمایان، کارگران و متخصصین سلامت شغلی قرار گیرند.

کلیدواژه ها: بیماریهای ریوی، پنوموکونیوزیس، سیلیس، فیروزه، معدن

گذشته جهانی شدن این صنعت فراگیر شده و هم اکنون شرکتهای بزرگ چند ملیتی در ایالت متحده، آمریکای جنوبی، آفریقا، اروپا، آسیا و استرالیا با تجهیزات و روش های مدرن مشغول به فعالیت هستند. با توجه به وجود عوامل زیان آور مختلف و متنوع در معادن این روند جهانی شدن یک فرصت مناسب را در اختیار متخصصین ایمنی و سلامت شغلی قرار داده تا

مقدمه

صنایع معدنی (Mining Industry) جزء صنایع پایه میباشد که جوامع مدرن امروزی را در تامین انرژی و مواد اولیه مورد نیاز سایر صنایع کمک می نماید. معدنکاری همواره بعنوان یک شغل و حرفه منطقه ای یا محلی شناخته شده است در حالیکه در طی یک دهه

۱- دکترای تخصصی، استادیار دانشکده پیراپزشکی و بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۲- (نویسنده مسئول) متخصص طب کار و بیماریهای شغلی، مرکز بهداشت استان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد Email:e.rafeemanesh@yahoo.com

۳- دکتراپزشکی، MPH، مرکز بهداشت استان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۴- کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای، مرکز بهداشت استان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۵- کارشناس بهداشت حرفه ای، مرکز بهداشت استان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

ابتلاء و غیبت از کار کارگران دارند. ارتباط بین کار در معدن و بیماریهای ریوی شغلی از حدود قرن ۱۶ میلادی یعنی زمانیکه آگریکولا اثرات مخرب گرد و غبار را بر سیستم تنفس انسان توصیف کرده، شناخته شده است. در قرن اخیر نیز بعلت ارتباط بین مواجهه با گرد و غبار سیلیس و ابلاطه به TB و همچنین وجود اپیدمیهای HIV در کشورهای در حال توسعه این بیماریهای بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است [۳]. شیوع بیماریهای ریوی بین معدنکاران و شدت بیماری به فاکتورهای مختلفی از جمله نوع کار کارگران، میزان مواجهه با گرد و غبار، مدت مواجهه، بیماریهای زمینه ای کارگران، عوامل محیطی و سبک زندگی بستگی دارد. بعوان امثال یکی از بیماریهای ریوی شایع در بین معدنکاران بیماری سیلیکوزیس میباشد. این بیماری شایعترین پنوموکوئیز در حال حاضر در جهان بوده که حذف کامل آن تا سال ۲۰۳۰ میلادی جزء برنامه ها و اهداف مشترک WHO/ILO میباشد. موارد واقعی ابلاطه این بیماری بیش از موادی است که سالانه گزارش می شود، بیشتر از موادی است که سالانه گزارش می شود، بنابراین شیوع واقعی بیماری همواره در حال افزایش می باشد [۴]. براساس اطلاعات علمی موجود مواجهه طولانی مدت با گرد و غبار سیلیس در مقادیر بالاتر از حد استاندارد ($1\text{mg}/\text{m}^3$) احتمال ایجاد تغییرات رادیولوژیک سیلیکوزیس، سرطان ریه و همچنین مرگ و میر ناشی از آن را افزایش میدهد. عوامل دیگر همچون مواجهه با گرد و غبار سیلیس تازه شکسته شده، ناخالصیهای همراه با سیلیس، مواجهات شدید و حساسیتهای فردی نیز در بروز بیماری در شاغلین معدن نقش دارند. عوارض اصلی مواجهه با گرد و غبار سیلیس و بیماری سیلیکوزیس شامل افزایش خطر ابلاطه بیماری سل، سرطان ریه، افزایش خطر ابلاطه به بیماریهای کلژن و اسکولار، افزایش خطر ابلاطه به بیماریهای قارچی ریوی می باشد که حتماً باید در غربالگریهای این گروه مد نظر کلیه متخصصین بهداشت حرفة ای و پزشکان طب کار قرار گیرد [۵]. فرمول شیمیایی فیروزه "فسفات هیدرات شده مس و آلومینیوم" است. برای تشکیل فیروزه نیاز به شرایط خاصی است. ابتدا بایستی در آن ناحیه چنین ویژگی وجود داشته باشد که این ویژگی باعث محدود شدن

بتوانند با یک نگرش و فرآیند جهانی به کنترل این خطرات بپردازند و از تجارب یکدیگر استفاده نمایند.

تولید مواد معدنی شامل دوفاز اصلی می باشد:

۱. فاز استخراج (Extraction phase) که شامل کلیه مراحل مربوط به خارج کردن سنگهای معدن از زمین میباشد.

۲. فاز فرآوری (Processing phase) که شامل کلیه مراحل جداسازی جزء ارزشمند سنگ از ضایعات و بخشهای فاقد ارزش میباشد.

بطور سنتی لغت معدنکاری به فاز اول تولید اطلاق می گردد و به کلیه افراد شاغل در هر دو قسمت معدنکار یا کارگر معدن گفته می شود. در واقع معدنکاری شامل کلیه مشاغلی می باشد که در تولید ماده معدنی قابل فروش و ارزشمند دخیل می باشند. چرخه کار معدن بطور خلاصه شامل انفجرار، حفاری، استخراج مواد، حمل مواد و همچنین بازسازی زمین و منطقه عملیات میباشد. مواد معدنی و کانیهایی که به خصوص در معادن فلزی وجود دارد می تواند بر سلامت کارگران اثر بگذارد [۱].

بیماریهای دستگاه تنفسی ناشی از کار و بیوژه بیماریهای ریوی امروزه جزء شایعترین بیماریهای شغلی هستند. براساس پیش بینی های اخیر، تقریباً ۴/۴ میلیون تن از کارگران صنایع معدنی و غیر معدنی ایالات متحده در معرض ذرات سیلیکای کریستالی یا غبار آزادیست قرار دارند. حتی در صورتی که ۰.۵٪ این کارگران (براساس یک تخمین محتاطانه) از بیماریهای تنفسی ناشی از تماس رنج ببرند، این عارضه بیش از ۱۰۰۰۰۰ تن را مبتلا خواهد کرد [۲].

استنشاق عوامل زیان آور موجود در محیط کار برای قسمتهای مختلف دستگاه تنفسی منجمله راههای هوایی فوقانی، راههای هوایی تحتانی و پارانشیم ریه خطر مهمی محسوب می گردد. در صورتیکه مواجهه با این عوامل طولانی مدت و با مقادیر کمتر آلاینده باشد می تواند منجر به اختلالات مزمنی نظیر آسم، برونشیت مزمن، فیروزه ریه و نهایتاً سرطان ریه شود. بهمین دلیل کلیه پزشکانی که در زمینه طب کار فعالیت دارند با شناسایی به موقع و درمان مناسب شاغلین در معرض مواجهه و انجام اقدامات پیشگیرانه محیطی نقش بسیار مهمی در کاهش مرگ و میر،



اسپیرومتری توسط یک کارشناس بهداشت حرفه‌ای آموزش دیده و با دستگاه Vitalograph Compact ساخت انجلستان (کالیبره شده) انجام شد. جهت تفسیر تست‌های اسپیرومتری از اندازه‌های FEV₁/FVC، FEV₁، FVC استفاده گردید. متغیرهای مورد مطالعه شامل سن، سابقه کار، نوع کار، مصرف دخانیات، نشانه‌ها و علایم تنفسی، یافته‌های رادیولوژیک، وضعیت عملکرد ریوی، سابقه ابتلاء به سل و تست مانتو می‌باشد. کلیه اطلاعات جمع آوری شده توسط اپراتور و توسط نرم افزار SPSS¹⁰ وارد رایانه شد و سپس تحت نظر مشاور آماری مورد آنالیز قرار گرفت.

معدن فیروزه در دنیا می‌شود. این معدن بایستی دارای ترکیبات فسفری و فلذ‌سپار باشند. فسفر و آلمینیوم مورد نیاز در اثر تحولات هیدروترمال از اسید فسفریک و فلذ‌سپار آزاد می‌شوند. صنعت فیروزه از مشاغل ویژه استان خراسان رضوی و حتی کشور ما ایران می‌باشد که تعداد زیادی شاغل بصورت مستقیم و غیر مستقیم در آن مشغول بکار می‌باشند و همواره در خصوص بیماری‌های ریوی این گروه از شاغلین صحبت شده اما کار تحقیقاتی جامعی تاکنون انجام نشده است. لذا بر آن شدیدم تا با انجام این پژوهش شیوع بیماری‌های ریوی در بین معدنکاران فیروزه نیشابور و عوامل موثر در بروز و شیوع این بیماریها را بررسی نمایم.

یافته‌ها

در این پژوهش مجموعاً ۱۱۷ نفر از شاغلین معدن فیروزه نیشابور مورد معاینه و ارزیابی قرار گرفتند. جهت جمع آوری اطلاعات از فرم طرح کشوری پیشگیری و کنترل سیلیکوزیس استفاده گردید. برای تعدادی از جمعیت مورد مطالعه گرافی قفسه صدری، تست تنفسی و تست PPD انجام شد. میانگین سن افراد ۴۲/۹ و میانگین سنوات کار آنان در معدن ۱۱/۵ سال بود. از جمعیت مورد بررسی تعداد ۱۱ نفر (۹ درصد) سابقه مصرف دخانیات را میانگین زمانی ۷ سال داشتند. ۸ نفر (۸/۶ درصد) تحت درمان بعلت بیماری ریوی مزمن بودند و ۵ نفر (۴/۲ درصد) تست PPD مثبت داشتند. وضعیت علایم و یافته‌های بالینی شاغلین به تفکیک در جدول ۱ آمده است.

۷۲ نفر از شاغلین مورد تست تنفسی قرار گرفتند. سایر افراد بدلیل غیبت از محل کاری عدم همکاری قادر به انجام تست قابل قبول نبودند. در مجموع از ۲۲ مورد تست اسپیرومتری غیرنرمال، ۱۸ نفر (۲۵ درصد) دارای الگوی انسدادی، ۳ نفر (۴ درصد) دارای الگوی تحدیدی و یک نفر (۱/۳ درصد) دارای الگوی مختلط بودند (نمودار ۱). این افراد دارای میانگین سنی ۵۵ سال بوده، ۳ نفر آنان سیگاری و ۴ نفر تحت درمان ریوی بودند. تعداد کل افرادیکه مورد تست مانتو قرار گرفتند >۴۷ نفر بود که جماعت نفر دارای تست مثبت ($>10\text{ mm}$) بودند. هیچیکی از افراد مبتلا به بیماری سیلیکوزیس دارای تست مثبت نبود.

در بررسی‌های رادیولوژیک از مجموع ۹۶ گرافی

روش بررسی

روستای معدن واقع در ۵۰ کیلومتری شهرستان نیشابور، محل اصلی قرار گیری معدن فیروزه می‌باشد که اغلب ساکنین این روستا یا شاغلین فعلی معدن می‌باشند و یا قبلاً در معدن کار می‌کرده و هم اکنون بازنیسته شده‌اند. این مطالعه مقطعی (Sectional-Cross) جهت کلیه شاغلین فعلی معدن فیروزه نیشابور (۹۲ نفر) و برخی از افراد بازنیسته معدن (۲۵ نفر) که ساکن روستانیز بودند (جمعاً ۱۱۷ نفر) انجام گردید. بمنظور جلب مشارکت شاغلین و بخصوص افراد بازنیسته سعی شد از طریق به‌هرز روستا افراد شناسایی، توجیه و سپس در این مطالعه مورد بررسی قرار گیرند. بمنظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه تنفسی طرح کشوری سیلیکوزیس که شامل شرح حال شغلی دقیق فرد، شکایت‌ها و علایم تنفسی وی می‌باشد استفاده گردید. علاوه بر پرسشنامه و معاینه فیزیکی جهت کلیه مراجعین گرافی قفسه صدری و تست اسپیرومتری نیز انجام گردید. شرایط شغلی مراجعین توسط کارشناسان بهداشت حرفة‌ای مرکز بهداشت شهرستان نیشابور و معاینات توسط پزشک متخصص طب کار انجام گردید. گرافیهای قفسه صدری استاندارد و با کیفیت مناسب توسط یک کلینیک رادیولوژی در شهر نیشابور انجام شد و کلیه گرافیهای توسط رادیولوژیست و پزشک متخصص طب کار دوره دیده در کارگاه تفسیر گرافیها بر اساس استانداردهای ILO مورد تفسیر قرار گرفت.

درصد	تعداد (نفر)	علامت یا نشانه	درصد	تعداد (نفر)	علامت یا نشانه
۵۰	۴	تنگی نفس	۱۶.۲	۱۹	تنگی نفس
۱۲.۵	۱	خلط	۹.۴	۱۱	خلط
۵۰	۴	سرفه	۱۱.۱	۱۳	سرفه
۰	۰	تب	۰	۰	تب
۰	۰	تعريق شبانه	۰	۰	تعريع شبانه
۲۵	۲	کاهش اشتها	۱.۷	۲	کاهش اشتها
۰	۰	درد قفسه سینه	۰	۰	درد قفسه سینه
۲۵	۲	کاهش وزن	۱.۷	۲	کاهش وزن
۰	۰	ویز در سمع ریه	۶	۷	ویز در سمع ریه
۲۵	۲	کراکل در سمع ریه	۵.۱	۶	کراکل در سمع ریه
۱۲.۵	۱	رونکای در سمع ریه	۳.۴	۴	رونکای در سمع ریه
۰	۰	سیانوز	۰	۰	سیانوز

جدول ۲- وضعیت عالیم و یافته های بالینی در افراد مبتلا به سیلیکوزیس


جدول ۱- وضعیت عالیم و یافته های بالینی در شاغلین مورد بررسی

۲ آمده است. ۷ نفر از مبتلایان به بیماری سیلیکوزیس مورد تست اسپیرومتری قرار گرفتند که میانگین ۷۶/۲ FEV₁/FVC درصد، ۹۷ FVC درصد، ۹۴ FEV₁ درصد بود. در مجموع در بین مبتلایان به بیماری سیلیکوزیس ۳ نفر الگوی انسدادی و یک نفر الگوی تحديدي داشتند. بین شکایتهای تنفسی (تنگی نفس، سرفه، خلط...)، اختلالات اسپیرومتریک و ابتلاء به سیلیکوزیس با سنتورات کاری همبستگی مستقیم وجود داشت.


بحث

بیماریهای ریوی شغلی بیماریهایی هستند که معمولاً بعلت قرار گرفتن در معرض مواد معدنی، مواد

گرفته شده، ۱۳ نفر (۱۳/۵ درصد) دارای گرافی قفسه صدری غیر نرمال بودند که ۷ نفر (۷/۲ آن) مبتلا به بیماری سیلیکوزیس ساده، یک نفر (۱/۰۴ درصد) مبتلا به سیلیکوزیس عارضه دار و ۵ نفر (۵/۲ درصد) مبتلا به سایر اختلالات ریوی همچون پرهوای ریوی، کاردیومگالی، ادم ریوی و... بودند (نمودار ۲). در بین ۸ نفر کارگر مبتلا به سیلیکوزیس که همگی از بازنیستگان معدن فیروزه بودند و در حال حاضر مشغول به کار در معدن نبودند، میانگین سنی (±۶/۱۶) (۲۹/۳۸) و میانگین سنوات کار (۱۲/۴۴) (۶۸/۶) بود. دونفر از مبتلایان سیگاری و ۳ مورد علامت دار و تحت درمان با داروهای تنفسی بودند. وضعیت عالیم بالینی در افراد مبتلا به بیماری سیلیکوزیس در جدول



نمودار ۱- وضعیت نتایج تست اسپیرومتری در شاغلین مورد بررسی (۷۲ مورد)



نمودار ۲- نتایج گرافیهای قفسه‌صدری

عملیات جداسازی اولیه در نزدیکی معدن و عملیات تراش و برش دقیق در کارگاههای فیروزه تراشی میباشد. سنگ فیروزه جزء سنگهای قیمتی و با فرمول شیمیایی فسفات هیدرات شده مس و آلمینیوم میباشد لذا هر چند تاکنون مطالعه‌ای در خصوص ابتلاء شاغلین کارگاههای فیروزه تراشی به بیماری سیلیکوزیس انجام نشده اما بنظر می‌رسد شاغلین این کارگاهها کمتر در معرض ابتلاء به بیماری باشند. در حالیکه کارگران معدن و بخصوص کارگران عملیات انفجار بیش از سایر قسمتهای در معرض گردوغبار بوده و امکان ابتلاء دارند.

نتایج مطالعه مادر معدنکاران فیروزه نیشابور نشان میدهد که هر چند شاغلین معدن فیروزه در معرض گردوغبار سیلیس بصورت طولانی مدت می‌باشند ولی شایعترین بیماری‌های ریوی مرتبط با شغل در بین کارگران معدن بیماری‌های انسدادی ریوی (آسم، برونژیت و...) می‌باشد. بیماری سیلیکوزیس در معدنکاران فعلی شیوع ندارد بلکه عمدۀ مبتلایان در شاغلین بازنیسته با میانگین ساپکه کاری حدود ۳۰ سال می‌باشند. شایعترین علایم بالینی در شاغلین به ترتیب عبارتند از تنگی نفس فعالیتی، سرفه، خلط و سپس ویزدر سماع ریه میباشد که میتواند دال بر شیوع بیشتر بیماری‌های انسدادی ریوی دانست.

هر چند میانگین متغیرهای اسپیرومتری همگی در محدوده نرمال بودند ولی ۱۸ مورد از شاغلین مبتلا به

آلی، آلزنهایا مواد محرک در محیط کار ایجاد شده و ممکن است باعث نارسائی حاد یا مزمن سیستم تنفسی گردد. در این میان مواجهه‌های کم و طولانی مدت میتواند بصورت آرام و تدریجی کارگران را در چار بیماری‌های مزمنی همچون برونشیت مزمن، آسم، پنوموکونیوزیس و... نماید که همگی این بیماری‌ها با تدابیر پیشگیرانه درست و بموقع قابل پیشگیری هستند. تهווیه مناسب، تغییر پروسه‌های کاری، آموزش کارگران و پوشش حفاظتی مناسب از جمله فاکتورهای پیشگیری می‌باشند^[۶].

در یک مطالعه انجام شده در کارگران معادن آفریقای جنوبی در سال ۲۰۰۴ معدن کار قدیمی از نظر ابتلاء به بیماری‌های ریوی شغلی مورد بررسی قرار گرفتند. جهت انجام مطالعه از پرسشنامه تنفسی، معاینات پزشکی، گرافی قفسه‌صدری و تست اسپیرومتری استفاده شد. در پایان این مطالعه شیوع پنوموکونیوز در جمعیت هدف ۳۱% - ۲۶/۶ و شیوع ۶/۸ PMF در تعیین گردید. افراد دارای سابقه ابتلاء به سل و افراد مبتلا به سیلیکوزیس در اندکس‌های اسپیرومتری محدودیت بیشتری داشتند. نتایج این مطالعه مشخص کرد که پنوموکونیوز در معدنکاران قدیمی شیوع بالایی دارد^[۷].

مراحل تهیه سنگ فیروزه شامل عملیات اکتشاف، عملیات انفجار و جمع آوری سنگ فیروزه، عملیات خارج ساختن سنگ خام فیروزه در عمق ۱۲۰ متری،

عملکردی ریه با درجه پیشرفت بیماری سیلیکوزیس در ارتباط بود.^[۸]

در یک پژوهش انجام شده در مغولستان که مقاله آن در سیزدهمین شماره ژورنال بین المللی سلامت محیط و کار در سال ۲۰۰۷ به چاپ رسید برونشیت مزمن و پنوموکونیوزیس بیشترین میزان بیماریهای ریوی شغلی را در مغولستان به خود اختصاص داد (۶۷/۸ درصد). با توجه به فراوانی معادن طلا و زغال در مغولستان محققین در پایان این مطالعه به لزوم اجرای برنامه های پیشگیرانه از طریق نظام سلامت تاکید نمودند.^[۹]

در پژوهش انجام شده روی ۳۰ نفر از کارگران جوان صنایع سنگ کوبی و شن و ماسه کرمانشاه در سال ۸۰ مشخص گردید که ۳/۵۳ درصد از کارگران دچار تنگی نفس و ۲۶/۷ درصد از سرفه و ۳۰ درصد از داشتن خلط اظهار شکایت میکنند. در ارزیابیهای اسپیرومتریک نیز ۷/۱۶ درصد دچار بیماریهای انسدادی (خفیف تا شدید) و ۴۰ درصد دچار عوارض تحیدی در حد خفیف بودند. در بررسیهای رادیولوژیک ۷/۱۶ درصد ندولاریتی مشابه سیلیکوزیس داشته و تنها یک نفر (۳/۳ درصد) مبتلا به سل ریوی بود. و این در حالی بود که تنها یک نفر از کارگران از ماسکهای تنفسی استفاده می کرد.^[۱۰]

صالحی و بنیسی در یک پژوهش در سال ۷۵ که گزارش آن در اولین کنگره بین المللی سم شناسی پژوهشکی آسیا واقیانوسیه به چاپ رسید، پرونده ۱۵۳ نفر از شاغلین معدن زغال سنگ زند کرمان را مورد بررسی و تحلیل قرار دادند. در پایان مطالعه مشخص گردید ۷۷ درصد کارگران فاقد علایم تنفسی و ۲۳ درصد مبتلاء به یکی از انواع بیماریهای تنفسی بودند. اغلب بیماران دارای سابقه کاری بالای ۱۵ سال بودند.^[۱۱]

نتیجه گیری

شرکتهای معدنی سالیانه مبالغه هنگفتی را بدليل بیماریها و حوادث ناشی از کار و عواقب آن همچون از کارافتادگی شاغلین، غیبت از کار، ضرر روزیان بهره‌وری و یا عنوان غرامت به افراد مبتلا پرداخت می نمایند، در حالیکه میتوانند با برنامه ریزیهای پیشگیرانه و مدیریت

بیماریهای انسدادی ریوی بودند. درین افراد مبتلا به سیلیکوزیس نیز بیشترین اختلال اسپیرومتری طرح انسدادی بود که این مسئله بیانگر این موضوع است که در کارگران مبتلا به بیماری سیلیکوزیس یافته های رادیولوژیک با یافته های اسپیرومتریک الزاماً مطابقت ندارد. ولی در موارد PMF یافته ها اغلب بصورت تحدیدی است که با یافته های رادیولوژیک هماهنگی دارد. درین افراد مبتلا به سیلیکوزیس شایعترین علایم تنگی نفس، سرفه، کاهش اشتتها، کاهش وزن و کراکل در سمع ریه ها بود. همگی افراد مبتلا دارای علائم نبودند بلکه فقط ۴ نفر بدليل علایم ریوی تحت درمان بودند. شیوع علایم تنفسی در افراد مبتلا به سیلیکوزیس یا بیماریهای انسدادی بیشتر بود. میانگین سالانه افراد مبتلا به سیلیکوزیس ۳۰ سال بود. بنابراین بیماری در افراد با سابقه بالا بروز بیشتری دارد. نتایج پژوهش نشان میدهد که هر چند بیماری سیلیکوزیس در معدنکاران قدیمی شیوع دارد اما کارگران جوان از سایر عوارض ناشی از کار در محیطهای معدنی پر گرد و غبار و بخصوص بیماریهای انسدادی ریوی در امان نیستند که امکان ابتلاء با افزایش سالیانه ایجاد شود. بهبود نظام مراقبت سلامت شغلی، غربالگری بموضع در حین کار و هنگام بازنشستگی در تشخیص این بیماریها بسیار موثر است.

وانگ و کریستیانی اساتید دانشگاه هاروارد در سال ۲۰۰۰، عوارض فیزیولوژیک و رادیولوژیک مواجهه با سیلیس، آزبست و زغال رادر کارگران صنایع مختلف چین مورد بررسی قرار دادند. ۲۲۰ کارگر در معرض سیلیس، ۲۲۷ کارگر در معرض آزبست و ۵۱۱ کارگر در معرض زغال در این مطالعه مورد اسپیرومتری قرار گرفتند. افت شاخصهای عملکردی ریه، تنگی نفس و سرفه مزمن در کلیه شاغلین مبتلا به پنوموکونیوز بدون توجه به نوع گرد و غبار دیده شد. کارگران مبتلا به سیلیکوزیس مرحله ۲ و ۳، بدترین تستهای عملکردی ریه را در مقایسه با سایر کارگران نشان دادند. نتایج این پژوهش نشان داد که علیرغم تفاوت های موجود در شدت و الگوی مواجهه با گرد و غبارهای مختلف، ناتوانی تنفسی در تمامی کارگران با پیشرفت فیبرоз ریوی و استعمال سیگار همراه است. کاهش تستهای



5. Brown T. Silica exposure, smoking, silicosis and lung cancer--complex interactions. *Occup Med (Lond)*. 2009 Mar;59(2):89-95.

6. Rosenstock L. Textbook of clinical occupational & environmental medicine. Second edition. 2005

7. Steen TW, Gyi KM et al. Prevalence of occupational lung disease among Botswana men formerly employed in the south african mining industry. *Occup Environ Med*. 1997 January; 54(1): 19-26.

8. Wang XR, Christiani DC. Respiratory symptoms and functional status in workers exposed to silica, asbestos, and coal mine dusts. *J Occup Environ Med*. 2000 Nov;42(11):1076-84.

9. Lkhasuren O, Takahashi K, Dash-Onolt L. Occupational lung diseases and the mining industry in Mongolia. *Int J Occup Environ Health*. 2007 Apr-Jun;13(2):195-201.

10. Barzegar A, et al. Baarrasi avamele tanafosi nashi az kar dar kargarane shaghel dar sanaye sangkoobi va shen va mase Kermanshah, majmooe maghalate panjomin hamayeshe emeni, behdasht va mohite zist dar maaden va sanaye madani; 2003. [Persian].

11. Salehi E, Banisi S. Barrasi bimarihaye tanafosi shoghli nashi az gardoghbar dar maadene kerman, majmooe maghalate avalin kongere beinalmelali samshenasi pezeshki asia va oghyanosie, Tehran; 1997. [Persian].

صحيح سلامت شاغلین، ضمن پیشگیری از بروز این بیماریها از عوارض دراز مدت آنها و همچنین صرف هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از بیماریها و حوادث شغلی جلوگیری نمایند. با توجه به افزایش بروز بیماری سیلیکوزیس در شاغلین باسابقه کاری بالا و امکان پیشرفت بیماری حتی بعد از قطع مواجهه، لزوم پیگیری و غربالگری شاغلین بازنیسته نیز روشن می‌گردد. بعلت عوارض غیرقابل درمان و ناتوانی دائمی ناشی از ابتلاء به این بیماری اقدامات پیشگیرانه در معادن بخصوص اقدامات سطح اول پیشگیری (اقدامات مهندسی، مدیریتی و تجهیزات حفاظت فردی) موثرترین واقتصادی ترین روش‌های پیشگیری میباشند که باید مورد توجه مدیران، کارفرمایان، کارگران، متخصصین بهداشت حرفه‌ای و پزشکان شاغل در صنعت قرار گیرد.

تقدیر و تشکر

در پایان جاداره از زحمات و حمایت‌های مدیریت و معاون محترم بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان نیشابور - آقایان دکتر درودی و دکتر حسینیان -، مسؤول محترم واحد بهداشت محیط و حرفه‌ای شهرستان نیشابور - آقای مهندس معروفی -، تلاش‌های شبانه روزی و پیگیریهای مجدانه همکاران محترم واحد بهداشت حرفه‌ای شهرستان نیشابور - مهندس جهانپاک و مهندس مشکانی - و همکاری بهورز روتای معدن در اجرای طرح پیشگیری و کنترل سیلیکوزیس سپاسگزاری و تشکر نماییم.

منابع

1. Mining health and safety guidance notes. Department of primary industries. The State of Victoria, Australia.2005.
2. Harrison's principals of internal medicine. Respiratory diseases. Kasper braunwald fauci.16th edition .2005
3. Glynn JR, Murray J, Bester A, Nelson G, Shearer S, Sonnenberg P. Effects of duration of HIV infection and secondary tuberculosis transmission on tuberculosis incidence in the South African gold mines. AIDS. 2008 Sep 12;22(14):1859-67.
4. Ross MH, Murray J. Occupational respiratory disease in mining. *Occup Med (Lond)*. 2005 Jan; 55(1):72-3.