



The Study of Lifestyle Changes in Medical Interns After Shift Work; A Prospective Cohort Study

Faezeh Zinati, Student Research Committee, Babol University of Medical Sciences, Babol, I.R.Iran.

Maryam Nikpour, Non-Communicable Pediatric Disease Research Center, Health Research Institute, Babol University of Medical Sciences, Babol, I.R.Iran.

✉ Aram Tirgar, (*Corresponding author), Social Determinants of Health Research Center, Health Research Institute, Babol University of Medical Sciences, Babol, I.R.Iran. a.tirgar@mubabol.ac.ir

Abstract

Background and aims: Medicine students, are forced to present or get some of their education and services during late night shifts. Shift work at night, can harm human health. The aims of this study is to determine the relation between shiftwork and medical student's life style as cohort study

Methods: This cohort study was conducted among medical students of Babol University of Medical Science. Medical students, who enrolled in 2012, completed the Life Style Questionnaire (LSQ). This questionnaire has 10 domains, and is compatible with the Iranian culture. Sampling was performed by census. At first, 92 students passing their last year of externship filled the research questionnaire. Then, after nine months (six months after their internship) they were given the same questionnaire to fill again. Data was analyzed with SPSS version 25 software.

Results: The mean age of the students was 23 ± 1.114 years. Out of the 92 students, 61 (67%) were female and 31 (33%) were male, and 21 percent of the students were married. The results of the study showed that shift work reduced the overall lifestyle score of medical interns of 12 points ($p < 0.001$). The major score reduction, was related to physical health ($p < 0.001$). Internship, led to the reduction of sport activity, attention to health ($p < 0.001$), attention to a good nourishing diet, weight control ($p = 0.003$), and a significant reduced attention to disease prevention ($p < 0.001$). It was noted that the shift work reduced the psychological, moral and social health of the interns significantly ($p = 0.004$, $p = 0.003$, $p < 0.018$ respectively). Also, consequently the medical students have been led to use drugs ($p = 0.035$), and intern's attention to environmental health have been considerably reduced ($p < 0.001$); but it couldn't lead to an increased rate of events among interns ($p = 0.314$). In his study no significant relation between the demographic variables and life style were found.

Conclusion: Medical interns' night shift work is directly associated with the reduction in the mean score of lifestyle. Therefore, improving life style and teaching the medical students about its negative effects and the ways of confronting the shift work's problems in addition to performing the true schedule of the shift work pattern is recommended.

Conflicts of interest: None

Funding: Babol University of Medical Sciences

Keywords

Medical student

Shift work

Life style

Received: 2019/11/02

Accepted: 2020/10/27

INTRODUCTION

Shift work is defined as working during unusual hours (e.g. between 6 pm and 6 am). About 15-30% of the working population in developed countries are shift workers. Shift work can be threat to human health by disrupting the physiological system's circadian rhythm, reducing the melatonin hormone, and disrupting the sleep-wake cycle (1). Shift work, can also affect the quality of human life and in general, the lifestyle of shift workers. (2).

Medical students are required to obtain or provide part of their education and services at nights during their internship, in the form of long shift work (3). Lifestyle is a multidimensional structure which includes the components of physical health, exercise and well-being, weight control and nutrition, disease prevention, psychosocial health, spiritual health, social health, avoidance of taking unnecessary medications, drugs and alcohol, accident prevention and environmental health (1).

Shift work in medical students can be associated with short- and long-term adverse effects on their health and lifestyle (4). Considering the importance of health and work sensitivity of medical students and due to the lack of sufficient information about the consequences of shift work and night shifts for this group, this study aimed to examine the relationship between shift work and lifestyles of medical interns.

METHOD AND MATERIAL

Study design and participant

This prospective cohort study was performed from 2017 to 2019 on 102 medical students which were enrolled in 2012 (class of 2019). The participants were interns at the educational hospitals affiliated to the Babol University of Medical Sciences. Sampling was done by census method based on the inclusion criteria. The inclusion criteria, included willingness to participate in the study and passing at least 6 months of the internship, as well as no history of systemic and mental illness, accidents, severe physical illness, stressful life events (e.g. death of a beloved, divorce, and marriage). The exclusion criteria included the withdrawal of cooperation in the study and failure to complete more than 11% of the questionnaire.

Data collection

The questionnaires used in the present study, included any demographical information (age,

sex, marital status, second job, parents' education, economic and social status and place of residence) and lifestyle. Lifestyle was assessed with a 70-item and 10-dimensional questionnaire of Iranianized Lifestyle Questionnaire (LSQ) (by Lali et al.). Each dimension was scored individually and the total score was obtained from the sum of all dimensions. The higher the score of the questionnaire, the better the lifestyle (3).

First, the students who were in the last year of their medical internship completed the questionnaires (lifestyle questionnaire, demographic information and shift work information) at the starting point of their internship. Then, they were followed up and asked to complete the same questionnaires again at least 6 months after entering the internship (approximately 9 months later).

Statistical Analysis

Descriptive statistics and t-test, chi-square and ANCOVA were used for analysis. P<0.005 was considered as a significant level.

RESULTS

Among 102 students, 10 cases were excluded from the study, and the statistical analysis was performed on the remaining 92 students. Among the 92 cases, 67% were female and 33% were male. The mean age of the participants was 23 ± 1.114 years.

The results of the present study reveals that the shift work has led to a significant decrease in the overall lifestyle score of the medical interns ($P<0.001$). Shift work causes a significant decrease in physical health score ($P<0.001$), exercise and paying attention to their well-being ($P<0.001$), paying attention to nutritional status and weight control ($P<0.003$) and paying attention to disease prevention ($P<0.001$). Also, the psychological, spiritual and social health of the interns was significantly reduced ($P<0.004$, $P<0.003$, $P<0.018$, respectively). Night shift work also led to the increased level in taking medications and drugs ($P<0.035$) and a decrease in paying attention to environmental health among medical interns ($P<0.001$). However, there was no significant relationship between shift works and the rate of traffic accidents among medical interns ($P<0.314$) (Table 1). The results also showed that no significant relationship was found between gender, marital status, parents' education, place of residence and economic status of shift work interns and their overall lifestyle score.

Table 1. Distribution of scores of lifestyle components of medical students of Babol University of Medical Sciences before and after shift work.

Variable	Mean ± SD		Mean D	P Value
	Training period	Internship		
Total life style	144.93±22.01	132.93±25.40	12.00	<0.001
Physical health	16.23±2.78	14.37±2.78	1.85	<0.001
Exercise and well-being	10.27±4.36	8.65±4.17	1.62	<0.001
Weight control and nutrition	11.07±3.37	9.82±3.40	1.25	0.003
Disease prevention	16.00±2.70	14.7±3.11	1.30	<0.001
Psychosocial health	15.15±3.66	13.89±4.07	1.26	0.004
Spiritual health	13.88±3.36	12.71±3.88	1.17	0.003
Social health	15.76±3.40	14.74±4.25	1.02	0.018
Taking unnecessary medications, drugs and alcohol	15.67±3.22	14.90±3.78	0.77	0.035
Accident prevention	16.75±4.26	16.26±4.32	0.48	0.31
Environmental health	14.15±3.02	12.95±3.24	1.25	<0.001

Mean ± SD: Mean and Standard Deviation; Mean D: Mean Difference

DISCUSSION

The results of the present study showed that shift worker interns had lower average score in exercise, well-being, weight control and nutrition compared to their training period. Due to the fact that shift workers usually spend less time on having a proper meal, this leads to changes in their eating habits and quality over time. The results of this study are consistent with the study of Zverev et al. (5) and the study of Marquez et al. (6); however, it was inconsistent with the study of Atkinson et al. (7). The probable reason for this inconsistency, could be that the shift worker with long working hours has less opportunity to do exercise (11). On the other hand, shift workers have to sleep and rest during day time, when it is time to do sport activities.

This study showed that shift work had no significant effect on the increase in traffic accidents among medical interns. This result is consistent with some studies, but it is inconsistent with studies of Garbarino et al. (8) and Barger et al. This could be due to the fact that most of the present study's participants used the public transport system after the end of their shifts.

The level of physical and mental health of the interns in this study has significantly decreased

compared to their training period, also paying attention to disease prevention has also decreased among interns. By disrupting the sleep-wake cycle, shift work can increase and exacerbate the anxiety and depression in shift workers. In the present study, participants were more likely to use medications and drugs during their internships than their training period. Shift work reduces the person's level of tolerance to work and life stress, which can be the reason for higher tendency to use various drugs indiscriminately (9). The results of another study in India also found that one-fifth of medical interns resort to high-risk behaviors such as smoking and drinking alcohol, to overcome stress (10).

CONCLUSION

The findings of the present study indicated a change in the lifestyle components among medical interns after shift work. The current situation, in addition to concerns related to students' health, notifies about the possible damages to the quality of education. Therefore, it could be useful to pay more attention to subtle educational planning, holding meetings and workshops for students to get acquainted with the problems caused by shift work and finding solutions to reduce these problems.

How to cite this article:

Faezeh Zinati, Maryam Nikpour, Aram Tirgar. The Study of Lifestyle Changes in Medical Interns After Shift Work; A Prospective Cohort Study. Iran Occupational Health. 2021 (01 Nov);18:22.

*This work is published under CC BY-NC 4.0 licence





بررسی تغییر سبک زندگی کارورزان پزشکی پس از نوبت کاری: یک کوهورت آینده نگر

فائزه زینتی: کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.

مریم نیک پور: مرکز تحقیقات بیماریهای غرباًگیر کودکان، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.

آرام تیرگر: (نوسنده مسئول) مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران. a.tirgar@mubabol.ac.ir

چکیده

کلیدواژه‌ها

سبک زندگی
دانشجویان پزشکی
نوبت کاری

تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

زمینه و هدف: دانشجویان رشته پزشکی در دوره کارورزی خود ناگزیرند بخشی از آموزش و خدمات خود را در ساعات شب، به صورت شیفت‌های طولانی مدت و نوبت کاری کسب یا ارائه کنند. نوبت کاری می‌تواند به سلامت انسان آسیب رساند. لذا این مطالعه با هدف تعیین ارتباط نوبت کاری با سبک زندگی دانشجویان پزشکی مقطع کارورزی به صورت آینده‌نگر طراحی شده است.

روش بررسی: این مطالعه به صورت آینده‌نگر (کوهورت) در میان دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام گردیده. دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۱ پرسشنامه سبک زندگی (LSQ) (Life Style Questionnaire) ایرانی شده دارای ۱۰ بعد را تکمیل کرده اند. نمونه گیری به صورت سرشماری انجام شده است. در ابتدا ۹۲ دانشجوی که سال آخر دوره کارآموزی خود را می‌گذرانند، پرسشنامه‌های پژوهش را تکمیل نموده اند. سپس مجدد ۹ ماه بعد همین پرسشنامه در اختیار این دانشجویان (۶ ماه بعد از دوره کارورزی) آنان قرار گرفته. سپس داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS ویرایش ۱۶ مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته اند.

یافته‌ها: میانگین سنی دانشجویان ۱۱/۱۴ سال می‌باشد. از ۹۲ دانشجو، ۶۱ نفر (۶۷٪) پسر و ۳۱ نفر (۳۳٪) دختر بودند. درصد از دانشجویان متاهل بوده اند. نتایج مطالعه نشان داده که نوبت کاری منجر به کاهش معنی دار نمره کلی سبک زندگی در کارورزان پزشکی به اندازه ۱۲ واحد شده است ($P<0.001$). بیشترین کاهش مربوط به مؤلفه سلامت جسمانی می‌باشد ($P<0.001$). همچنین نوبت کاری انجام فعالیت‌های ورزشی و توجه به تندرستی ($P<0.001$)، کاهش توجه به وضعیت تقدیمه و کنتول وزن ($P<0.003$) و کاهش توجه به پیشگیری از بیماری‌ها ($P<0.001$) به طور معناداری شده است. شایان ذکر است که نوبت کاری سلامت روان شناختی، معنوی و اجتماعی کارورزان را به طور معناداری کاهش داده ($P<0.004$ ، $P<0.003$ ، $P<0.018$ ، $P<0.008$). منجر به افزایش استفاده از داروها و مواد مخدر در کارورزان پزشکی شده است ($P<0.035$) و توجه به سلامت محیطی را در کارورزان به طور معنی داری کاهش داده است ($P<0.001$). اما توانسته منجر به افزایش میزان حوادث در بین کارورزان شود ($P<0.314$). در این مطالعه ارتباط معناداری میان متغیرهای جمعیت شناختی و سبک زندگی یافته نشده است ($P<0.05$).

نتیجه گیری: نوبت کاری با کاهش میانگین نمرات سبک زندگی در کارورزان پزشکی ارتباط دارد. از این رو آموزش دانشجویان پزشکی در رابطه با ارتقاء سبک زندگی و اثرات و راههای مقابله با مشکلات نوبت کاری به همراه اجرای برنامه‌ریزی صحیح الگوی نوبت کاری توصیه می‌شود.

تعارض منافع: گزارش نشده است.

منبع حمایت کننده: دانشگاه علوم پزشکی بابل.

شیوه استناد به این مقاله:

Faezeh Zinati, Maryam Nikpour, Aram Tirgar. The Study of Lifestyle Changes in Medical Interns After Shift Work; A Prospective Cohort Study. Iran Occupational Health. 2021 (01 Nov);18:22.

*انتشار این مقاله به صورت دسترسی آزاد مطابق با CC BY-NC 4.0 صورت گرفته است

مقدمه

بخشی از آموزش و خدمات خود را در ساعت شب، به صورت شیفت های طولانی مدت و نوبت کاری کسب یا ارائه کنند (۳). اگرچه این الگوی آموزش و کار می تواند باعث افزایش تجربیات و مهارت های آنان به عنوان پزشکان آینده و تامین کنندگان سلامت جامعه شود (۲۷)، اما در مقابل با اثرات کوتاه مدت و بلند مدتی بر سلامت و از جمله سبک زندگی همراه است (۲۸، ۴) با توجه به شرایط فوق نگرانی هایی از حیث سلامت و سبک زندگی دانشجویان، افت کیفیت آموزشی و کاسته شدن از کیفیت خدمات پزشکی و در نهایت آسیب به بیماران بواسطه این نوع از الگوی کار (نوبت کاری) متصور است. نتایج پژوهشی در هندوستان در ارتباط با سبک زندگی در کارورزان پزشکی نیز نشان داد، که تقریباً نیمی از آنان استرس بالایی را تحمل می کنند. یک پنجم از دانشجویان برای غلبه بر استرس به رفتارهای پر خطر مانند مصرف سیگار و الکل پناه می برند، هم چنین ۳۷ درصد الگوی غذایی نامناسبی دارند (۱۰). محققین علت استرس بالا در کارورزان را ناشی از نقش انتقالی آنها از یک ناظر به یک کارورز و هم چنین در نتیجه احساس مسئولیت، مقابله با شک (در مواجهه با بیماری) و روابط بین فردی ذکر می کنند (۲۹). با توجه به اهمیت سلامت و حساسیت کار دانشجویان پزشکی و از سوی عدم اطلاعات کافی پیرامون پیامدهای نوبت کاری و کار در شب برای این گروه، بر آن شدیم تا با انجام تحقیقی به تعیین ارتباط نوبت کاری با سبک زندگی کارورزان پزشکی بپردازیم.

روش بررسی

پژوهش حاضر یک کوهورت آینده‌نگر است که در سال های ۱۳۹۶-۹۸ بر روی دانشجویان پزشکی ورودی ۱۳۹۱ که دوره کارآموزی و کارورزی خود را در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی با بل مشغل خدمت و تحصیل بودند، انجام گردیده است. نمونه‌گیری به شیوه سرشماری با توجه به معیارهای ورود انجام شده. حجم نمونه ۱۰۲ نفر می باشدند. معیارهای ورود به پژوهش شامل تمایل به شرکت در مطالعه و گذراندن حداقل ۶ ماه از دوره کارآموزی و همچنین نداشتن سابقه بیماری های سیستمیک و روحی و روانی، وقوع حوادث، بیماری های شدید جسمی، رویدادهای پرفشار زندگی (مرگ عزیزان، طلاق، ازدواج) بر اساس خود اظهاری و معیارهای خروج شامل: قطع همکاری در مطالعه، عدم تکمیل بیش از ۱۱ درصد از پرسشنامه می باشد. اطلاعات جمع‌آوری شده

نوبت کاری به هر گونه اشتغال در زمان های غیر متعارف روز و خارج از پنجره زمانی کار معمول (بصورت قراردادی ۷ صبح تا ۶ عصر) اطلاق می گردد که در بسیاری از سازمان های خدماتی و صنایع مورد استفاده قرار می گیرد (۱۱). گزارش های آماری حکایت از آن دارد که حدود ۳۰ درصد از جمعیت شاغل در کشورهای توسعه یافته را نوبت کاران تشکیل می دهند (۱۲، ۱۳). به طوری که در ایالات متحده یک پنجم نیروی کار حدود ۲۰ میلیون نفر را نوبت کاران تشکیل می دهند (۱۴). البته پیش بینی می شود در کشورهای در حال توسعه این آمار به دلیل سازمان دهی نامناسب ساعت کاری از میزان بیشتری برخوردار باشد (۱۵).

با توجه به نتایج مطالعات، نوبت کاری از طریق بر هم زدن ساعت بیولوژیکی بدن^۱، کاهش هورمون ملاتونین و اختلال در نظم چرخه خواب و بیداری به عنوان یک عامل تهدید کننده سلامت انسان می باشد (۱). برخی از مطالعات نشان داده اند، که اشتغال به نوبت کاری با بروز مشکلات جسمی چون اختلالات گوارشی (۱۶)، قلبی و عروقی (۱۷، ۱۸)، سندرم متابولیک (۱۹)، چاقی (۲۰) و دیابت (۲۱) در ارتباط است. هم چنین افراد نوبت کار در معرض مشکلات روانی چون اختلالات خلقی، تحریک پذیری، اضطراب، افسردگی (۲۲) و برخی پیامدهای اجتماعی مانند تعارض کار با خانواده و مشکلات اجتماعی می باشند (۲۳، ۲۴). با توجه به مطالب ذکر شده، در مجموع می توان گفت نوبت کاری قادر است بر کیفیت و شیوه زندگی انسان (۲۵) و در مجموع بر سبک زندگی افراد نوبت کار تاثیر گذار باشد. مهمترین عاملی که می تواند در سراسر عمر بر سبک زندگی افراد تاثیر گذارد ویژگی ها و شرایط محیطی به ویژه شرایط شغلی است (۲). سبک زندگی سازه ای چند بعدی است که از مولفه های سلامت جسمانی، ورزش و تندرستی، کنترل وزن و تغذیه، پیشگیری از بیماری ها، سلامت روان شناختی، سلامت معنوی، سلامت اجتماعی، اجتناب از داروها، مواد مخدر و الکل، پیشگیری از حوادث و سلامت محیطی تشکیل شده است (۲۵). سبک زندگی سالم و رفتارهای ارتقادهنه دنده سلامت، راهبردهای اصلی برای حفظ سلامت افراد می باشند (۲۶). سبک زندگی هر فرد رابطه تنگاتنگی با سلامتی او دارد، به طوری که شیوه زندگی سالم سبب ارتقای سلامتی فرد می شود.

دانشجویان رشته پزشکی در دوره کارورزی خود ناگزیرند

۱ .Circadian rhythm

دلیل بیماری سخت جسمانی از مطالعه خارج شد، سه نفر در حین انجام مطالعه، محل تحصیل خود را تغییر دادند و همچنین دو نفر نیز به دلیل ازدواج در فاصله کارآموزی و کارورزی از مطالعه خارج شدند. در نتیجه آنالیز آماری بر روی ۹۲ نفر انجام شد. نتایج آماری نشان می‌دهد که از این تعداد ۶۱ نفر دانشجوی دختر (۶۷٪) و ۳۱ نفر دانشجوی پسر (۳۳٪) می‌باشند. میانگین سنی دانشجویان در مرحله اول 11.4 ± 2.3 سال می‌باشد. از لحاظ وضعیت تأهل ۲۲٪ در مرحله اول از دانشجویان متأهل و مابقی مجرد بوده اند (جدول ۱).

نتایج مطالعه نشان می‌دهد که نوبت کاری منجر به کاهش نمره کلی سبک زندگی در کارورزان پزشکی به اندازه ۱۲ واحد شده است که این اختلاف معنادار می‌باشد ($P < 0.001$). بیشترین کاهش مربوط به مؤلفه سلامت جسمانی می‌باشد. به طوری که میانگین نمره سلامت جسمانی در دوران کارآموزی $23/23$ و بعد از نوبت کاری $16/23$ و در دوران کارورزی $37/37$ بوده است که کاهش $1/85$ در میانگین معنی‌دار می‌باشد ($P < 0.001$). همچنین نوبت کاری منجر به کاهش انجام فعالیت‌های ورزشی و توجه به تندرستی ($P < 0.001$)، کاهش توجه به وضعیت غذیه و کنترل وزن ($P < 0.001$) و کاهش توجه به پیشگیری از بیماری‌ها ($P < 0.001$) به طور معناداری شده است. سلامت روان‌شناختی، معنوی و اجتماعی کارورزان را به طور معناداری کاهش داده است (به ترتیب $4/0.003$ ، $18/0.004$ ، $1/0.005$ ، $1/0.006$)، منجر به افزایش استفاده از داروها و مواد مخدر در کارورزان پزشکی گردیده است ($P < 0.003$) و توجه به سلامت محیطی را در کارورزان به طور معنی‌داری کاهش داده است ($P < 0.001$)؛ اما نتوانسته منجر به افزایش میزان حوادث رانندگی در بین کارورزان شود ($P < 0.314$) (جدول ۲). همچنین یافته‌های این مطالعه نشان داد که ارتباط معناداری میان متغیرهای جمعیت شناختی مانند جنس، وضعیت تأهل، تحصیلات پدر و مادر، مکان زندگی و وضعیت اقتصادی کارورزان نوبت کار و اثرات نامطلوب نوبت کاری بر نمره کلی سبک زندگی وجود ندارد.

بحث

این مطالعه به منظور تعیین تغییر سبک زندگی و مؤلفه‌های آن در کارورزان پزشکی پس از نوبت کار شدن انجام شده است. نتایج حاصل از این بررسی نشان می‌دهد که نوبت کاری بر روی سلامت جسمانی، روان‌شناختی، معنوی، اجتماعی، محیطی، ورزش و تندرستی، کنترل

شامل: پرسشنامه سبک زندگی ایرانی شده^۱ (توسط علی و همکاران) بود، این پرسشنامه حاوی ۷۰ سؤال به صورت ۴ گزینه‌ای همیشه تا هرگز تنظیم شده است و دارای ۱۰ بعد می‌باشد. هر بعد به صورت جداگانه نمره دهی می‌شود و نمره کلی سبک زندگی با جمع نمرات ابعاد، به دست می‌آید. نمرات بالاتر نشان‌دهنده سبک زندگی بهتر است. هر چند پرسشنامه‌های متعددی برای بررسی سبک زندگی وجود دارد، اما چون این پرسشنامه در ایران طراحی شده و مطابق با فرهنگ ایرانی می‌باشد و فرآیند روان‌سنجی با روایی صوری، محتوا، سازه و هم‌زمان و پایابی با آلفا کرونباخ ($0.74/0.84$) و آزمون باز آزمون ($0.001/0.001$) انجام گردیده، از این پرسشنامه استفاده شده است (۲۵). همچنین اطلاعات جمعیت شناختی شامل سن، جنس، وضعیت تأهل، شغل دوم، تحصیلات والدین، ارزیابی وضعیت اقتصادی و سلامتی به وسیله خود، محل زندگی و سکونت نیز ارزیابی شده است.

در ابتدا دانشجویانی که سال آخر دوره کارآموزی خود را می‌گذرانند، پرسشنامه‌های مطالعه را تکمیل نموده اند و سپس در ادامه همین دانشجویان پیگیری شده و حداقل ۶ ماه بعد از ورود به دوره کارورزی (تقریباً ۹ ماه بعد) دوباره پرسشنامه‌ها در اختیار آنان قرار گرفته است. بعد از تکمیل پرسشنامه توسط دانشجویان،داده‌ها جمع‌آوری و پس از استخراج وارد برگه‌های ورود اطلاعات در کامپیوتر گردیده و سپس داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS² تحت ویرایش ۲۵ مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار می‌گیرد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری نتایج از شاخص‌های آمار توصیفی مانند فراوانی، فراوانی نسبی و انحراف معیار و همچنین از شاخص‌های آمار استنباطی مانند آزمون‌های آماری تی، مجذور کای و آنکووا استفاده می‌گردد. ($P < 0.005$) به عنوان سطح معنی‌دار در نظر گرفته شده است.

ملاحظات اخلاقی

این مطالعه در کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی بابل به شماره MUBABOL.HRI.REC.1396.163 تائید شده است.

یافته‌ها

از ۱۰۲ نفر از دانشجویان پزشکی ورودی ۱۳۹۱، چهار نفر از ابتدا حاضر به شرکت در مطالعه نشدند. در نتیجه ۹۸ مشارکت‌کننده وارد مطالعه شدند که یک نفر به

¹ Lifestyle Questionnaire (LSQ)

² Statistical Package for Social Sciences

جدول ۱. ویژگی‌های جمعیت شناختی دانشجویان پزشکی ورودی ۱۳۹۱ دانشگاه علوم پزشکی بابل

متغیر	فرآوانی	درصد فرآوانی
جنسیت	دختر	۶۱
	پسر	۳۱
وضعیت تأهل	مجرد	۷۷٪/۹
	متاهل	۲۲٪/۱
اشغال حین تحصیل	بله	۲۱٪/۳
	خبر	۷۸٪/۷
ارزیابی وضعیت اقتصادی	ضعیف	۶٪/۶
	متوسط	۴۴٪/۴
تحصیلات پدر	خوب	۴۸٪/۹
	دانشگاهی	۵۵٪/۹
تحصیلات مادر	دانشگاهی	۴۴٪/۱
	دیپلم و پایین‌تر	۴۲٪/۶
محل زندگی	دیپلم و پایین‌تر	۵۷٪/۴
	شهر	۵۷٪/۱
روستا	روستا	۵٪/۵
محل سکونت	خوابگاه و منزل دانشجویی	۳۴٪/۱
	همراه با خانواده	۶۵٪/۹


جدول ۲. توزیع نمرات مؤلفه‌های سبک زندگی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل ورودی ۱۳۹۱ قبل و بعد از نوبت کاری

متغیر	انحراف معیار \pm میانگین		سطح معنی‌داری	اختلاف میانگین
	کارآموزی	کارورزی		
سبک زندگی (کل)	۱۴۴/۲۲ \pm ۹۳/۰۱	۱۳۲/۲۵ \pm ۹۳/۴۰	<0.001	۱۲/۰۰
سلامت جسمانی	۱۶/۴ \pm ۲۳/۷۸	۱۴/۲ \pm ۳۷/۷۸	<0.001	۱/۸۵
ورزش و تندرستی	۱۰/۴ \pm ۲۲/۳۶	۸/۴ \pm ۶۵/۱۷	<0.001	۱/۶۲
کنترل وزن و تغذیه	۱۱/۳ \pm ۰/۷۳۷	۹/۳۴ \pm ۸۲	0.003	۱/۲۵
پیشگیری از بیماری‌ها	۱۶/۲ \pm ۰/۷۰	۱۴/۳ \pm ۷۰/۱۱	<0.001	۱/۳۰
سلامت روان‌شناختی	۱۵/۳ \pm ۱۵/۶۶	۱۳/۴ \pm ۸۹/۰۷	0.004	۱/۲۶
سلامت معنوی	۱۳/۳ \pm ۸۸/۳۶	۱۲/۳ \pm ۷۱/۸۸	0.003	۱/۱۷
سلامت اجتماعی	۱۵/۳ \pm ۷۶/۴۰	۱۴/۴ \pm ۷۲/۲۵	/۰۱۸	۱/۰۲
استفاده از داروها و مواد مخدر	۱۵/۳ \pm ۷۸/۲۲	۱۴/۳ \pm ۹۰/۷۸	/۰۳۵	۰/۷۷
پیشگیری از حوادث	۱۶/۴ \pm ۷۵/۲۶	۱۶/۴ \pm ۶۲/۲۲	۰/۳۱۴	۰/۴۸
سلامت محیطی	۱۴/۳ \pm ۱۵/۰۲	۱۲/۳ \pm ۹۵/۳۴	<0.001	۱/۲۵

را برای وعده‌های غذایی اختصاص می‌دهند، در طول زمان منجر به تغییر عادات غذایی و مقدار غذایی مصرف شده می‌شود (۳۰). نتایج این مطالعه همسو با پژوهش Zverev و همکاران در مورد ارتباط نوبت‌کاری و عادات تغذیه‌ای است که نشان می‌دهد افراد نوبت‌کار در معرض اضافه وزن ناشی از الگوی غذایی با توجه به ماهیت کارشناس قرار دارند (۵). مطالعه Atkinson و همکاران نشان می‌دهد که تفاوت معناداری بین تعادل انرژی بدنی و فعالیت بدنی افراد نوبت‌کار و غیر نوبت‌کار وجود دارد (۷). همچنین مطالعه Marquez و همکاران نشان داد که افراد نوبت‌کار ورزش و فعالیت بدنی کمتری نسبت به افراد غیر نوبت‌کار دارند (۶). دلیل احتمالی آن می‌تواند این باشد که فرد

وزن و تغذیه، پیشگیری از بیماری‌ها و استفاده از داروها و مواد مخدر کارورزان پزشکی تأثیرگذار بوده؛ اما بر میزان حوادث در بین کارورزان تأثیری نداشته است. یافته‌های این مطالعه نشانگر آن است که ارتباط معناداری میان متغیرهای جمعیت شناختی مانند جنس وضعیت تأهل، تحصیلات پدر و مادر، مکان زندگی و وضعیت اقتصادی کارورزان نوبت کار و اثرات نامطلوب نوبت کاری بر نمره کلی سبک زندگی وجود ندارد.

در این مطالعه نشان داده شد که کارورزان نوبت کار در ورزش و تندرستی و کنترل وزن و تغذیه میانگین نمرات پایین‌تری را در مقایسه با دوران کارآموزی خود کسب کرده‌اند. با توجه به اینکه نوبت کاران معمولاً زمان کمتری



شکل ۱. تغییر نمره کلی سبک زندگی کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل ورودی ۱۳۹۱ قبل و بعد از نوبت کاری سال ۱۳۹۶-۹۸.

خوابیدن در طول رانندگی در آن‌ها افزایش می‌یابد (۳۰). این مطالعه نشان داده است که سطح سلامت جسمانی و سلامت روان‌شناختی کارورزان در مقایسه با دوران کارآموزی خود افت معناداری داشته است و توجه به پیشگیری از بیماری‌ها در میان کارورزان کاهش یافته است. نوبت کاری با بر هم زدن ریتم سیرکادین، کاهش هورمون ملاتونین و اختلال در نظم چرخه خواب و بیداری به عنوان یک عامل تهدیدکننده سلامت جسمی، روانی و اجتماعی به شمار می‌آید. قرار دادن شخص در وضعیتی که از خواب طبیعی به مقدار کم بهره‌مند گردد باعث تحریک‌پذیری و عصبانیت وی می‌گردد. به همین دلیل تصور می‌شود که نوبت کاری می‌تواند باعث افزایش و تشدید حالت‌های اضطرابی و افسردگی شود (۱۱). اضطراب زیاد در این حرفه می‌تواند به علت فقدان تعطیلات، کار زیاد و شلوغی (۳۲)، برخورد با مسائل و مشکلات بیماران، فشار‌های روحی محیط بیمارستان (۳۲) و تلاش به منظور برآورده کردن نیازهای بیماران در تمام مدت شبانه‌روز همراه با یادگیری حرفه‌ای باشد. همچنین افزایش نگرانی در خصوص مسائل شغلی، ازدواج و نیازهای ضروری در سال‌های آخر تحصیلی هم می‌تواند دلایل دیگری برای این موضوع باشند (۳۳).

نوبت کاری موجب کاهش سطح تحمل فرد در برابر تنش‌های شغلی و زندگی می‌شود که همین امر موجب تمایل فرد به مصرف بی‌رویه‌ی داروهای مختلف است (۹). فرد نوبت کار به خاطر بیدار ماندن در طول شب به داروهای محرك پناه می‌آورد و از طرفی پس از پایان نوبت کاری به دلیل اشکال در شروع خواب مجبور به استفاده از داروهای

نوبت کار با ساعت کاری طولانی فرصت کمتری جهت انجام فعالیت‌های ورزشی دارد (۳۰). از طرفی روزها که زمان انجام فعالیت‌های ورزشی است فرد نوبت کار به خواب و استراحت می‌پردازد.

این مطالعه نشان می‌دهد که نوبت کاری تأثیر معناداری بر میزان افزایش حوادث رانندگی در بین کارورزان پزشکی نداشته است. علت احتمالی این می‌تواند باشد که اکثر کارورزان مطالعه در دوران کارورزی خود به استقلال مالی لازم به منظور تهیه وسایل حمل و نقل شخصی نرسیده‌اند درنتیجه در پایان ساعت کاری طولانی به جای استفاده از وسایل نقلیه شخصی از ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنند. این نتیجه‌گیری با برخی مطالعات همخوانی دارد (۳۱) و با برخی دیگر تطابق ندارد (۳۰، ۳۱). برای مثال با نتایج مطالعه انجام شده به وسیله کاووسی و همکاران که بر روی پرستاران بیمارستان‌های منتخب آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شده است، هم راستا بوده است. نتایج مطالعه آنان نشان می‌دهد که ۵۵ درصد از افراد مورد مطالعه دچار حوادث شغلی شده‌اند و حوادث به وجود آمده در افراد صبح کار بیشتر بوده است (۳۱)؛ در مقابل گاربارینو (۴) و همکاران در مطالعه‌ای بر روی کارکنان اداره پلیس ایتالیا عنوان کردند که نوبت کاری با مکانیسم خواب‌آلودگی موجب افزایش حوادث ناشی از کار می‌شود (۸). همچنین نتایج پژوهش بارگر (۵) و همکاران نشان داده که کارورزانی که در معرض نوبت کاری طولانی هستند در معرض خطر تصادف با وسایل نقلیه موتوری قرار دارند. کارورزانی که در طول یک ماه، ۵ بار یا بیش از آن نوبت کاری طولانی (بیش از ۲۴ ساعت) دارند، خطر

- den and management. Medical Journal of Australia. 2013;199:S11-S5.
2. Plasker E. The 100 Year Lifestyle: Dr. Plasker's Break-through Solution for Living Your Best Life-Every Day of Your Life! Simon and Schuster; 2007.
 3. Samadi F, Tirgar A, Nikpour M, Sefidchian A. Shift Work in Medical Students: A Cross-sectional Study on Medical Interns. Archives of Occupational Health. 2017;1(1):6-12.
 4. Barnawi RA, Kurdi YA, Khizindar AT, Ghurab AM, Alfaer SS, Balubaid HK, et al. Prevalence and Severity of Stress and Its Associated Factors Among Junior Doctors. Int J Biol Med Res. 2017;8(1):5787-92.
 5. Zverev YP, Misiri HE. Perceived effects of rotating shift work on nurses'sleep quality and duration. Malawi Medical Journal. 2009;21(1):19-21.
 6. Marqueze EC, Ulhôa MA, Moreno CRdC. Effects of irregular-shift work and physical activity on cardiovascular risk factors in truck drivers. Revista de saude publica. 2013;47:497-505.
 7. Atkinson G, Fullick S, Grindey C, Maclaren D. Exercise, energy balance and the shift worker. Sports Medicine. 2008;38(8):671-85.
 8. Garbarino S, De Carli F, Nobili L, Mascialino B, Squarcia S, Penco MA, et al. Sleepiness and sleep disorders in shift workers: a study on a group of Italian police officers. Sleep. 2002;25(6):642-7.
 9. Rahimpour F, Mohammadi S, Aghilinejad M, Attarchi M, Malek M, Dehghan N. Comparison of Sleep Disorders among Nightshift guard men in Iran University Hospitals Using ESS and PSQI questionnaires in 2009. Occupational Medicine Quarterly Journal. 2011;2(1):39-43.
 10. Chandramouleeswaran S, Edwin NC, Braganza D. Job stress, satisfaction, and coping strategies among medical interns in a South Indian tertiary hospital. Indian journal of psychological medicine. 2014;36(3):308.
 11. Zamanian Z, Dehghani M, Mohammady H, Rezaeiani M. Investigation of Shift Work Disorders among Security Personnel. International Journal of Occupational Hygiene. 2012;4(2):91-4. (Persian)
 12. Boivin DB, Tremblay GM, James FO. Working on atypical schedules. Sleep medicine. 2007;8(6):578-89.
 13. Mousavi SM, Sharifinia S, Yazdani Rad S, Esmaeilzadeh A, Hajizadeh R, MoradiRad R. The Relationship between shift work and its effects on the health of the operational staff in Abadan Oil Refining Company. Journal of Preventive Medicine. 2017;4(2):19-25. (Persian)
 14. Shields M. Shift work and health. Health rep. 2002;13(4):11-33.
 15. Ljoså CH, Lau B. Shiftwork in the Norwegian petroleum industry: overcoming difficulties with family and social

خواب آور می‌شود (۳۴). در این مطالعه کارورزان در مقایسه با دوران کارآموزی خود تمایل بیشتری به استفاده از داروها و مواد مخدر دارند. نتایج پژوهشی در هندوستان در ارتباط با سبک زندگی در کارورزان پزشکی نیز نشان داد که تقریباً نیمی از آنان استرس بالایی را تحمل می‌کنند که یک‌پنجم از آن‌ها برای غلبه بر استرس به رفتارهای پرخطر مانند مصرف سیگار و الکل پناه می‌برند (۱۰) همچنین نتایج مطالعه هیوندو^۱ و همکاران نشان داد که میزان استرس، علائم افسردگی و تمایل به مصرف سیگار در پرستاران نوبت‌کار بیش از پرستاران غیر نوبت‌کار بوده است (۳۵).

نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که نوبت‌کاری بر سلامت اجتماعی دانشجویان تأثیر سوء معنی‌دار دارد. اختلال در انجام سرگرمی‌ها، فعالیت‌های گروهی و شرکت در جامعه از تأثیرات منفی نوبت‌کاری است و عموماً لازمه چنین فعالیت‌هایی مشارکت منظم می‌باشد که با برنامه‌های همیشگی نوبت‌کاری دچار اختلال می‌شود. یک کارگر شیفت که نمی‌تواند در چنین فعالیت‌هایی به طور منظم حضور داشته باشد به راحتی این حس را در خود ایجاد می‌کند که از گروه اجتماعی دور افتاده است (۳۶). از محدودیت‌های این پژوهش می‌توان به حجم پایین نمونه اشاره کرد. که به همین علت نمونه گیری به صورت سرشماری انجام گردیده است. همچنین از دیگر محدودیت‌های این پژوهش می‌توان به عدم اندازه گیری استرس شغلی به عنوان یک عامل مخدوش کننده پژوهش اشاره نمود. انجام مطالعه به صورت کوهورت از نقاط قوت این مطالعه می‌باشد.

نتیجه‌گیری

یافته‌های مطالعه حاضر حاکی از تغییر مؤلفه‌های سبک زندگی کارورزان پزشکی پس از نوبت‌کار شدن می‌باشد. وضعیت اخیر علاوه بر دغدغه‌های مرتبط با سلامت دانشجویان، احتمال آسیب‌های واردہ بر کیفیت آموزش را گوشزد می‌نماید. از این‌رو ضرورت توجه هر چه بیشتر به برنامه‌ریزی دقیق آموزشی و برگزاری جلسات و کارگاه آموزشی برای دانشجویان جهت آشنایی با مشکلات ناشی از نوبت‌کاری و راههای کاستن از مشکلات می‌تواند سودمند باشد.

فهرست منابع

1. Rajaratnam SM, Howard ME, Grunstein RR. Sleep loss and circadian disruption in shift work: health bur-

1. Hyoudo

Iran Occupational Health. 2021 (01 Jan);18: *.

- Research. 2012, 15 (1), (29);1-7.
26. Ghanbari Sartang A, Dehghan H, Abbaspoor Darbandy A. Comparison of health promoting life style in rotating shift work vs fixed shift work nurses. *Iranian Journal of Rehabilitation Research*. 2016;2(2):32-8(Persian).
 27. Bagdye P, Parmar D, Adikane H. Job stress among interns of a tertiary care hospital in central India. *Sch J Appl Med Sci*. 2016;4(8F):3128-31.
 28. Giri P, Parhar G. Internship: a transition from a medical student to a doctor. *IJBAR*. 2012;3(10):753-55.
 29. Liu C-H, Tang W-R, Weng W-H, Lin Y-H, Chen C-Y. The process of coping with stress by Taiwanese medical interns: a qualitative study. *BMC medical education*. 2016;16(1):10.
 30. Barger LK, Cade BE, Ayas NT, Cronin JW, Rosner B, Speizer FE, et al. Extended work shifts and the risk of motor vehicle crashes among interns. *New England Journal of Medicine*. 2005;352(2):125-34.
 31. Kavosi Z, Dehghan Meymandi F, Kharazmi E. Investigation of Disorders and Problems caused by Shift Work in Selected Nurses of Public-Educational Hospital of Shiraz University of Medical Sciences, 2015. *Management Strategies in Health System*. 2017;2(1):3-11 (Persian).
 32. Omigbodun OO, Odukogbe A-TA, Omigbodun AO, Yusuf OB, Bella TT, Olayemi O. Stressors and psychological symptoms in students of medicine and allied health professions in Nigeria. *Social psychiatry and psychiatric epidemiology*. 2006;41(5):415-21.
 33. Rahaei Z, Yarmohammadi P, Fatahi E, Mehri H, Kasiri N. The relationship between demographic variables with general health and quality of life in students of Islamic Azad University, Sabzevar Branch, Iran. *Qom University of Medical Sciences Journal*. 2015;9(10):40-7.
 34. Nasrabadi A, Seif H, Latifi M, Rasoolzadeh N, Emami A. Night shift work experiences among Iranian nurses: a qualitative study. *International nursing review*. 2009;56(4):498-503 (Persian).
 35. Hyoudo H. A study of the work conditions, daily living habits and occupational stress of nurses and care workers employed by nursing care medical facilities. *Journal of Rural Medicine*. 2009;4(1):7-14.
 36. Rosa R, Colligan M. Plain language about shiftwork, DHHS. NIOSH) Publication. 1997. <https://www.cdc.gov/niosh/nioshtic-2/00240354.html>
 - life-a cross sectional study. *Journal of Occupational Medicine and Toxicology*. 2009;4(1):22.
 16. Saksvik IB, Bjorvatn B, Hetland H, Sandal GM, Pallesen S. Individual differences in tolerance to shift work-a systematic review. *Sleep medicine reviews*. 2011;15(4):221-35.
 17. Asare-Anane H, Abdul-Latif A, Ofori EK, Abdul-Rahman M, Amanquah SD. Shift work and the risk of cardiovascular disease among workers in cocoa processing company, Tema. *BMC research notes*. 2015;8(1):798.
 18. Nikpour M, Tirgar A, Hajiahmadi M, Ebadi A, Ghaffari F, Hosseini A, et al. A cross-sectional study on serum high-sensitivity C-reactive protein level and shift work among reproductive age women. *Caspian Journal of Internal Medicine*. 2019;10(4):402.
 19. Nikpour M, Tirgar A, Hajiahmadi M, Hosseini A, Heidari B, Ghaffari F, et al. Shift work and metabolic syndrome: A multi-center cross-sectional study on females of reproductive age. *Biomedical reports*. 2019;10(5):311-7.
 20. Sun M, Feng W, Wang F, Li P, Li Z, Li M, et al. Meta-analysis on shift work and risks of specific obesity types. *Obesity reviews*. 2018;19(1):28-40.
 21. Gan Y, Yang C, Tong X, Sun H, Cong Y, Yin X, et al. Shift work and diabetes mellitus: a meta-analysis of observational studies. *Occupational and environmental medicine*. 2015;72(1):72-8.
 22. Ardekani ZZ, Kakooei H, Ayattollahi S, Choobineh A, Seraji GN. Prevalence of mental disorders among shift work hospital nurses in Shiraz, Iran. *Pak J Biol Sci*. 2008;11(12):1605-9. (Persian)
 23. Nikpour M, Tirgar A, Ebadi A, Ghaffari F, Firouzbakht M, Hajiahmadi M. Development and psychometric evaluation of a women shift workers' reproductive health questionnaire: study protocol for a sequential exploratory mixed-method study. *Reproductive health*. 2018;15(1):22.
 24. Parvin N, Fatemi A, Aminian F, Rafiee Vardanjani L. Effectiveness of life training skills on marital satisfaction of female nurses in Hajar Hospital in Shahrekord city-a clinical trial. *Journal of Clinical Nursing and Midwifery*. 2014;3.
 25. Lai A, Abedi A, Kajbaf MB. Construction and validation of the lifestyle questionnaire (LSQ). *Psychological*